

「子供への新型コロナワクチン接種 慎重に考えましょう」のデータ元

子供の新型コロナの死亡者3人（2021年12月21日までの累計）

新型コロナウイルス感染症の国内発生動向（速報値）

（令和3年12月21日24時時点）
【註1】チャーター機、クルーズ船案件は除く
【註2】医療機関からの届出情報との突合前

死亡者数（人）

	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代以上	年齢階級計
計	0	3	27	85	292	834	1636	4238	10707	18375
男	0	2	19	61	232	668	1233	2901	5213	10389
女	0	1	7	21	58	155	378	1288	5369	7303

Jiji.com

新着記事 連載 特集 写真・動画 ランキング 2021

トップ 政治 国際 社会 経済 スポーツ エンタメ 地域

時事ドットコムニュース > 社会 > コロナ感染の10代死亡 全国初、基礎疾患あり一大阪

コロナ感染の10代死亡 全国初、基礎疾患あり一大阪

2021年09月08日17時12分



大阪府庁＝大阪市中央区

大阪府は8日、新型コロナウイルスに感染した10代後半の男性が死亡したと発表した。男性には基礎疾患など複数の重症化リスクがあり、ワクチンも未接種だったという。

「#赤ちゃんに触らないで」 感染恐れ母呼び掛けー新型コロナ

厚生労働省の7日時点の集計では10代以下の感染者の死亡は報告されておらず、全国初とみられる。

府によると、男性は9月1日夜に大阪市内の病院へ救急搬送された。新型コロナ以外の病状で搬送されたものの、病院到着後の検査でコロナ感染が確認された。その後、同じ病院内のコロナ患者専用の重症病床で治療を受けていたが、7日に死亡した。

国内では12歳以上が新型コロナワクチンを接種できるが、男性は受けていなかった。府は男性の重症化リスクについて、個人情報保護を理由に明らかにしていない。

YAHOO! JAPAN ニュース IDでもっと便利に新規取得 ログイン ペイペイ残高使える・もらえる、ふるさと納税

キーワードを入力

トップ 速報 ライブ 個人 オリジナル みんなの意見 ランキング

主要 国内 国際 経済 エンタメ スポーツ IT 科学 ライフ 地域

新型コロナ 基礎疾患のある10代女性が死亡 横浜市

9/22(水) 17:58 配信 66



横浜市役所

横浜市中区で新型コロナに感染した10代の女性が死亡した。女性には基礎疾患があったという。

【映像】入院遅れ死亡「こんなことが日本で…」 自宅療養の現実

横浜市によると、女性はもともと慢性的肺疾患があり、自宅で酸素吸入する治療を受けていた。8月20日に呼吸の状態が悪化して入院し、次の日、PCR検査で新型コロナウイルスの陽性が判明した。

その後、徐々に状態が悪くなり、18日に死亡した。

(ANNニュース)

東京新聞 TOKYO Web

新型コロナ 東京 首都圏 社会 政治 経済 国際 スポーツ

社会

東京、新規感染248人 コロナ、10代含む8人死亡

2021年9月28日 20時48分 (共同通信)



東京駅前

東京都は28日、新型コロナの感染者が新たに248人報告されたと発表した。直近7日間を平均した1日当たりの新規感染者数は340・9人に減少し、前週比は51・3%。前日と比べ、入院患者は112人減の1266人、うち重症者は8人減の117人となった。都外在住の10代男性を含む8人の死亡も確認された。

都によると、10代男性の死因は事故。死亡後に検査し陽性が判明した。事故の詳細は公表せず、「感染と事故は無関係とみられる」としている。都内で10代の感染者の死亡が確認されたのは初めて。新型コロナ感染の届け出が都内の医療機関だったため、都内の死者として計上された。

子供のインフルエンザの死亡者 65人（2019年の1年間）

サイト「薬屋のおやじのボヤキ」
<https://blog.goo.ne.jp/miyakekazutoyo230910/e/135821b2fb8ea1a0c4c6bc7753fa2e13>
にインフルエンザの死亡者の検索方法の記載があります。

死因分類には、「ICD10」と「死因簡易分類」があります。
後者を使い、ネット検索すると、インフルエンザ：10100 と出てきます。これをメモっておきます。
次に厚労省のデータベースへのアクセスです。
データセット一覧 人口動態調査
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&year=20190&month=0&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053065&result_back=1&tclass4val=0
スクロールしていくと、ずっと下のほうにあります、
下巻 2 死亡数、死因（死因簡易分類）・性・年齢（5歳階級）別
これをクリックすると、
人口動態調査 / 人口動態統計 確定数 死亡
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&year=20190&month=0&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053065&stat_infid=000031982792&result_back=1&tclass4val=0
このページの左上の方にある「表示ダウンロード」のなかの「CSV」をクリックし、一番上のファイルをクリック。
すると、エクセルのファイルが開きます。
死因簡易分類のインフルエンザは10100ですから、だいぶ下のほうですが、「総数 3 5 7 5」が見つかります。併せて年令別、男女別のデータを見ることができます。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&year=20190&month=0&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053065&result_back=1&tclass4val=0

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450011&tstat=000001028897&cycle=7&year=20190&month=0&tclass1=000001053058&tclass2=000001053061&tclass3=000001053065&stat_infid=000031982792&result_back=1&tclass4val=0

1	令和元年	人口動態統計													
2	下巻	死亡 第2表	死亡数、死因（死因簡易分類）・性・年齢（5歳階級）別												
3			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳
235	10100	総数	3575	3	16	6	7	3	35	14	8	8	4		
236		男 M,	1903	2	9	2	5	1	19	10	5	8	3		
237		女 F,	1672	1	7	4	2	2	16	4	3	-	1		
238	10200	総数	95518	27	8	2	2	1	40	4	4	7	6		
239		男 M,	53076	14	5	2	2	-	23	2	3	4	1		
240		女 F,	42442	13	3	-	-	1	17	2	1	3	5		

東洋経済オンラインの記事中にも「65人」の記載あり。
<https://toyokeizai.net/articles/-/450974?page=2>

東洋経済
ONLINE

9月29日（水）
週刊東洋経済プラス | 四季報オンライン | シネマ

トップ 新型コロナ ビジネス 政治・経済 マーケット キャリア・教育 ライフ 鉄道

政治・経済 ▶ 新型コロナ、長期戦の混沌

新型コロナ医療崩壊の原因は開業医の不作為だ

国民に活動制限を強いるのはムダ弾で筋違い

太崎 明子：東洋経済 解説コラムニスト 著者フォロー

2021/08/27 5:30

シェア 5582 B! 234 印刷 1A A

動を制限することは必要ない」と話す。

さらに、「子どもの感染が問題になっているが、10代以下の子どもは新型コロナで1人も死んでいない。しかし、季節性のインフルエンザでは乳幼児や10代以下の子どもたちが死ぬ。2019年にも65人が亡くなっている。子どもにとっては明らかに季節性インフルエンザのほうが怖い」という。

次ページ 病床数や医師の数は十分なのに新型コロナを診ない

1 2 3 4 5

2

ファイザー 2023年 5月 臨床試験完了予定
モデルナ 2022年10月 臨床試験完了予定

note「新型コロナ騒動の情報サイト」の記事「新型コロナワクチン情報の厳選まとめ」より。
https://note.com/info_shinkoro/n/n8e88da9471ac

治験期間中であること

新型コロナワクチン研究の完了予定日は、
ファイザー：2023年5月2日、モデルナ：2022年10月27日です。
つまり、「現在は治験期間中であること」を理解する必要があります。

Sponsor:

BioNTech SE

Collaborator:

Pfizer **ファイザー**

Information provided by (Responsible Party):

BioNTech SE

研究開始日

Actual Study Start Date ⓘ: April 29, 2020
Estimated Primary Completion Date ⓘ: **November 2, 2021**
Estimated Study Completion Date ⓘ: **May 2, 2023**

研究完了予定日

米国政府が運営するNational Library of Medicineより引用：
[Study to Describe the Safety, ... ClinicalTrials.gov](#)

Sponsor:

ModernaTX, Inc. **モデルナ**

Collaborators:

Biomedical Advanced Research and Development Authority
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Information provided by (Responsible Party):

ModernaTX, Inc.

Actual Study Start Date ⓘ: July 27, 2020
Estimated Primary Completion Date ⓘ: **October 27, 2022**
Estimated Study Completion Date ⓘ: **October 27, 2022**

米国政府が運営するNational Library of Medicineより引用：
[A Study to Evaluate Efficacy, ... ClinicalTrials.gov](#)

8

13歳の男の子が2回目を接種してから、数時間後に亡くなった例を含め、10代ではワクチン接種後に5人が亡くなっています。

第74回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会（2021年12月24日開催）

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00036.html

「資料 1 - 3 - 1 新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要（コミナティ筋注）」

「資料 1 - 3 - 2 新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要（スパイクバックス筋注）」

ファイザーワクチン接種後の10代死亡事例 4件

(症例No1378 12歳の症例は、情報元がSNSのみであることから、今回のチラシの人数には加えていません)

[illegible]

モデルナワクチン接種後の10代死亡事例 1件

No	年齢 (性別)	性別	接種日	誕生日	ロット番号	接種回数	接種所名等	注意事項 (報告書による見解・考案等)		専門家による評価(10/22時点)		専門家による評価(11/22時点)					
								医師が 否定した理由に 基づいた検査	医療関係 (報告書添付)	伝染病の有無性 の判断 (報告書添付)	ワクチンと症状との 因果関係判断 (詳細記載*)	コメント	ワクチンと症状との 因果関係判断 (詳細記載)	コメント	評価に際した報告内容*		
															報告書上の記載	列示するMedDRA PT	資料番号
28	19歳	男	2021年6月18日	2021年9月28日	000229	1回目	高岡市の国産肺炎球菌について 接種後に熱、接種の可否を断れ られたため中止。 7月1日の接種後、発熱は出な かった。接種履歴もたれておらず。	国産肺炎球菌に対する臨床試験未実施	疑出血	OT「国産肺炎球菌 13価の臨床試験 実施中」 詳細不能	有(国産肺炎球 菌)	γ	[コメント無し]	γ	[コメント無し] ※→10/22から変更なし。	資料2-2-2-2	16751

概要まとめ

	No	年齢	性別	接種回数	基礎疾患	原因・経過など
ファイザー	961	16	男	1回目	注意欠陥多動性障害	自殺（マンション最上階から転落）
	1167	16	男	1回目	なし	接種6日目に心停止、21日目に非閉塞性腸管虚血、22日目死亡
	1328	13	男	2回目	気管支喘息	2時間半後に食事、約4時間後に入浴したが、出てこなかったため、確認したところ浴槽内で水没しているところを発見され、救急要請。
	1349	19	女	2回目	体幹機能障害、双極性障害、脳性麻痺	2回目接種約1ヶ月後、浴槽内で心肺停止状態で発見され、救急要請。
モデルナ	36	15	男	1回目	脳動脈奇形	約9時間後に頭痛、嘔吐後、意識障害をきたして救急搬送。脳動脈奇形からの脳室穿破を伴う脳出血。

新型コロナワクチン接種後
重篤者は**5,081**人

	重篤者数
10代	336 人
20代	668 人

第74回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会（2021年12月24日開催）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00036.html

「資料１－１－１ 予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について」p.7より。

重篤者数は、死亡者数を含んでいます。このちらしでは、純粋な重篤者数のみを計算しています。

①コミュニティ筋注				②スパイクバックス筋注				③バキスゼブリア筋注				①～③の合計				
	副反応	重篤	死亡		副反応	重篤	死亡		副反応	重篤	死亡		副反応	重篤	死亡	純粋な重篤者数
0～4歳	0	0	0	0～4歳	0	0	0	0～4歳	0	0	0	0～4歳	0	0	0	0
5～9歳	0	0	0	5～9歳	0	0	0	5～9歳	0	0	0	5～9歳	0	0	0	0
10～14歳	279	95	1	10～14歳	27	9	0	10～14歳	0	0	0	10～14歳	306	104	1	103
15～19歳	747	170	3	15～19歳	472	67	1	15～19歳	0	0	0	15～19歳	1219	237	4	233
20～24歳	1705	219	3	20～24歳	877	110	5	20～24歳	0	0	0	20～24歳	2582	329	8	321
25～29歳	2215	298	14	25～29歳	516	66	3	25～29歳	0	0	0	25～29歳	2731	364	17	347
30～34歳	2035	256	6	30～34歳	404	75	6	30～34歳	0	0	0	30～34歳	2439	331	12	319
35～39歳	2509	333	12	35～39歳	344	61	1	35～39歳	0	0	0	35～39歳	2853	394	13	381
40～44歳	2897	364	9	40～44歳	338	46	8	40～44歳	1	0	0	40～44歳	3236	410	17	393
45～49歳	2888	407	24	45～49歳	334	63	4	45～49歳	7	4	0	45～49歳	3229	474	28	446
50～54歳	2287	332	31	50～54歳	251	59	7	50～54歳	2	2	0	50～54歳	2540	393	38	355
55～59歳	1753	262	25	55～59歳	180	41	6	55～59歳	3	2	0	55～59歳	1936	305	31	274
60～64歳	1197	227	26	60～64歳	107	17	3	60～64歳	1	1	0	60～64歳	1305	245	29	216
65～69歳	1195	341	55	65～69歳	91	21	1	65～69歳	0	0	0	65～69歳	1286	362	56	306
70～74歳	1176	438	118	70～74歳	58	12	1	70～74歳	0	0	0	70～74歳	1234	450	119	331
75～79歳	945	419	126	75～79歳	16	3	1	75～79歳	0	0	0	75～79歳	961	422	127	295
80歳以上	2318	1329	580	80歳以上	13	10	3	80歳以上	0	0	0	80歳以上	2331	1339	583	756
不明	14	6	1	不明	4	0	0	不明	0	0	0	不明	18	6	1	5
合計	26160	5496	1034	合計	4032	660	50	合計	14	9	0	合計	30206	6165	1084	5081

2021年12月24日に発表された「第74回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会」より。
 接種期間は、2021年2月17日～2021年12月5日
 ①～③は、「資料１－１－１ 予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について」p.7からそのまま転記。
 ④は①～③の合計数を計算し、重篤者数から死亡者数を引いた計算結果
 副反応に、重篤と死亡が含まれる。重篤に死亡が含まれる。

現時点で、10代・20代の男女で、ワクチン接種後に、281人の心筋炎疑い、76人の心膜炎疑いが報告されています。

第74回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会（2021年12月24日開催）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00036.html

「資料 1－7－1 副反応疑い報告の状況について」より。

ファイザー社ワクチン接種後における心筋炎疑い報告

製造販売業者から心筋炎疑いとして報告された事例

- 初回免疫時に係るファイザー社ワクチン接種後の心筋炎疑いとして、ら274例の報告があり、10歳代及び20歳代男性の報告頻度が多い傾向

1回目、2回目接種後合計		注：年齢の記載について、									
年齢	歳	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	
男性	例	28	48	22	18	8	5	10	5	5	
男性100万回接種当たり		13.4	12.9	8.2	6.0	2.4	1.3	2.1	0.8	0.8	
男性100万人接種当たり		26.1	25.5	16.0	11.6	4.6	2.5	4.1	1.6	1.6	
女性	例	3	9	2	3	3	7	5	4	6	

ファイザー社ワクチン接種後における心膜炎疑い報告

製造販売業者から心膜炎疑いとして報告された事例

- 初回免疫時に係るファイザー社ワクチン接種後の心膜炎疑いとして、ら116例の報告があり、10歳代及び20歳代男性の報告頻度が多い傾向

1回目、2回目接種後合計		注：年齢の記載について、									
年齢	歳	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	
男性	例	6	19	8	9	5	4	2	3	2	
男性100万回接種当たり		2.9	5.1	3.0	3.0	1.5	1.0	0.4	0.5	0.3	
男性100万人接種当たり		5.6	10.1	5.8	5.8	2.9	2.0	0.8	1.0	0.7	
女性	例	1	2	1	0	2	4	2	1	7	

武田/モデルナ社ワクチン接種後における心筋炎疑い報告

製造販売業者から心筋炎疑いとして報告された事例

- 初回免疫時に係る武田/モデルナ社ワクチン接種後の心筋炎疑いに製造販売業者から200例の報告があり、10歳代及び20歳代男

1回目、2回目接種後合計		注：年齢の記載について、									
年齢	歳	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	
男性	例	5	42	59	37	11	3	6	6	1	
男性100万回接種当たり		42.3	50.6	27.9	19.7	5.9	1.5	3.0	2.6	0.5	
男性100万人接種当たり		80.0	98.7	55.0	38.9	11.8	3.0	5.9	5.2	1.0	
女性	例	0	1	2	2	2	2	2	4	3	

武田/モデルナ社ワクチン接種後における心膜炎疑い報告

製造販売業者から心膜炎疑いとして報告された事例

- 初回免疫時に係る武田/モデルナ社ワクチン接種後の心膜炎疑いに製造販売業者から43例の報告があり、10歳代及び20歳代男

1回目、2回目接種後合計		注：年齢の記載について、									
年齢	歳	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	
男性	例	2	6	10	6	1	0	2	3	1	
男性100万回接種当たり		16.9	7.2	4.7	3.2	0.5	0	1.0	1.3	0.5	
男性100万人接種当たり		32.0	14.1	9.3	6.3	1.1	0	2.0	2.6	1.0	
女性	例	0	3	2	1	2	1	0	1	1	

10代・20代心筋炎疑い（1回目、2回目合計）2021年12月24日報告										
		10-14	15-19	20-24	25-29	合計				
ファイザー	男性	28	48	22	18	116	男性合計			
モデルナ	男性	5	42	59	37	143		259		
ファイザー	女性	3	9	2	3	17	女性合計		男女合計	
モデルナ	女性	0	1	2	2	5		22		281

10代・20代心膜炎疑い（1回目、2回目合計）2021年12月24日報告										
		10-14	15-19	20-24	25-29	合計				
ファイザー	男性	6	19	8	9	42	男性合計			
モデルナ	男性	2	6	10	6	24		66		
ファイザー	女性	1	2	1	0	4	女性合計		男女合計	
モデルナ	女性	0	3	2	1	6		10		76

参考 10代のみのデータ

10代心筋炎疑い（1回目、2回目合計）2021年12月24日報告					
		10-14	15-19	合計	
ファイザー	男性	28	48	76	男性合計
モデルナ	男性	5	42	47	123
ファイザー	女性	3	9	12	女性合計
モデルナ	女性	0	1	1	13
					男女合計 136

10代心膜炎疑い（1回目、2回目合計）2021年12月24日報告					
		10-14	15-19	合計	
ファイザー	男性	6	19	25	男性合計
モデルナ	男性	2	6	8	33
ファイザー	女性	1	2	3	女性合計
モデルナ	女性	0	3	3	6
					男女合計 39

第38回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和3年6月9日）資料3－6 藤井先生提出資料p.17、p.18

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00256.html


【第三波】重症・死亡例について推定される感染経路（令和3年6月7日時点）

死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

第三波の重症例1,148名について、推定される感染経路の7割は感染経路不明者。


死亡例938名について、推定される感染経路の5割強が施設・医療機関関連で、3割強が感染経路不明者。

重症例（N=1,148）について推定される感染経路



施設・医療機関関連(154名)の内訳	
医療機関関連	94
高齢者施設関連	56
障がい者施設関連	4

死亡例（N=938）について推定される感染経路



※重症例1,148例のうち、233例は死亡のため重複あり

施設・医療機関関連 (511名)の内訳	
医療機関関連	272
高齢者施設関連	238
障がい者施設関連	1

年代	重症例 総数	感染経路内訳						陽性者 総数	重症化率
		施設・ 医療機関関連	その他 クラスター関連	濃厚接触者 (家庭内感染)	濃厚接触者	濃厚 接触者	感染 経路不明		
未就学児	1			1				689	0.15%
20代	2	1					1	7,079	0.03%
30代	14		1	1			12	4,654	0.30%
40代	42	2		1		3	36	4,851	0.87%
50代	142	7	3	6		11	115	4,994	2.84%
60代	246	20		24		17	185	3,393	7.25%
70代	451	57	7	49	3	32	303	3,658	12.33%
80代	224	48	2	16		18	140	2,797	8.01%
90代	26	19		1		2	4	899	2.89%
計	1,148	154	13	99	3	83	796	33,014	—

年代	死亡例総数	感染経路内訳								陽性者総数	死亡率
		施設・医療機関関連	学校関連	その他クラスター関連	濃厚接触者（家庭内感染）	濃厚接触者（施設関連）	濃厚接触者（その他クラスター）	濃厚接触者	感染経路不明		
30代	1								1	4,654	0.02%
40代	3							1	2	4,851	0.06%
50代	14	5						2	7	4,994	0.28%
60代	55	16		1	3	1		3	31	3,393	1.62%
70代	239	106		2	14			10	107	3,658	6.53%
80代	414	225		2	19	2	1	23	142	2,797	14.80%
90代	202	150			5	2		13	32	899	22.47%
100代	10	9						1	36		27.78%
計	938	511		5	41	5	1	53	322	25,282	—

【第四波】重症・死亡例について推定される感染経路（令和3年6月7日時点）


死亡率：新規陽性者に占める死亡者の割合

第四波の重症例1,693名について、推定される感染経路の7割は感染経路不明者で第三波と同じ傾向。施設・医療機関関連の割合は第三波に比べ、減少。

死亡例1,265名について、推定される感染経路の3割強が施設・医療機関関連で、第三波の5割強より減少。

感染経路不明者は5割であり、第三波の3割より増加。


重症例（N=1,693）について推定される感染経路



施設・医療機関関連(113名)の内訳	
医療機関関連	70
高齢者施設関連	35
障がい者施設関連	5
児童施設関連	2
福祉施設関連	1

死亡例（N=1,265）について推定される感染経路

※重症例1,693例のうち、313例は死亡のため重複あり



施設・医療機関関連 (406名)の内訳	
医療機関関連	187
高齢者施設関連	211
障がい者施設関連	5
児童施設関連	1
福祉施設関連	2

年代	重症例総数	感染経路内訳							陽性者総数	重症化率
		施設・医療機関関連	学校関連	その他クラスター関連	濃厚接触者（家庭内感染）	濃厚接触者（施設関連）	濃厚接触者（その他クラスター）	感染経路不明		
10代	1	1							4,518	0.02%
20代	20	1			2		3	14	11,757	0.17%
30代	39				5		5	29	7,436	0.52%
40代	142	1		4	6		14	117	7,962	1.78%
50代	337	13	1	4	39		37	243	7,407	4.55%
60代	402	23	1	2	48		48	280	4,464	9.01%
70代	550	38		2	80	1	65	364	4,257	12.92%
80代	187	32			24	1	19	111	2,937	6.37%
90代	15	4			1		2	8	903	1.66%
計	1,693	113	2	12	205	2	193	1,166	51,641	—

年代	死亡例 総数	感染経路内訳							陽性者 総数	死亡率
		施設・ 医療機関関連	その他 クラスター関連	濃厚接触者 (家庭内感染)	濃厚接触者 (施設内感染)	濃厚 接触者	感染 経路不明			
30代	6			1		1	4	7,436	0.08%	
40代	17	1		1		1	14	7,962	0.21%	
50代	56	4		3		3	46	7,407	0.76%	
60代	111	27		12		4	68	4,464	2.49%	
70代	361	77	1	37	1	37	208	4,257	8.48%	
80代	487	179	2	35	4	52	215	2,937	16.58%	
90代	218	114		9		22	73	903	24.14%	
100代	9	4				2	3	44	20.45%	
計	1265	406	3	98	5	122	631	35,410	—	

新型コロナワクチン接種後（2021年12月17日まで）
1,431人死亡※ ／ 約1億9,850万回 接種

首相官邸 新型コロナワクチンについて
<https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html>
日別の実績のエクセルデータより。

これまでのワクチン総接種回数（合計）			
公表日	曜日	総合計(3回目接種分を含む)	
		累計	増加回数
2021/12/28	(火)	199,596,362	255,620
2021/12/27	(月)	199,340,742	220,598
2021/12/24	(金)	199,120,144	89,661
2021/12/23	(木)	199,030,483	106,718
2021/12/22	(水)	198,923,765	113,748
2021/12/21	(火)	198,810,017	107,925
2021/12/20	(月)	198,702,092	204,362
2021/12/17	(金)	198,497,730	77,759

インフルエンザワクチン接種後（3年間の平均）
6人死亡／約5,273万回 接種

平成29年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告について
<https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000463317.pdf>

2. インフルエンザワクチンの副反応疑い報告状況（平成29年シーズン）

（1）副反応疑い報告数・頻度

インフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告数及び同ワクチンの医療機関納入数量から算出した推定接種者数に基づく報告頻度は表1のとおりでした。

表1 副反応疑い報告数及び推定接種者数

推定接種者数 (回分)	医療機関からの報告*			製造販売業者からの報告 (重篤報告)**	
	報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数(報告頻度)		重篤報告数(報告頻度)	
		うち死亡報告数		うち死亡報告数	
49,176,766 (H30.4.30現在)	246 (0.0005%)	92 (0.0002%)	9 (0.00002%)	69 (0.0001%)	0 (0%)

平成30年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告について
<https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000583992.pdf>

2. インフルエンザワクチンの副反応疑い報告状況（平成30年シーズン）

（1）副反応疑い報告数・頻度

インフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告数及び同ワクチンの医療機関納入数量から算出した推定接種者数に基づく報告頻度は表1のとおりでした。

表1 副反応疑い報告数及び推定接種者数

推定接種者数 (回分)	製造販売業者からの報告 (重篤報告)*		医療機関からの報告**		
	重篤報告数(報告頻度)		報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数(報告頻度)	
	うち死亡報告数			うち死亡報告数	
52,511,510 (H31.4.30現在)	53 (0.00010%)	0 (0%)	208 (0.00040%)	78 (0.00015%)	3 (0.0000057%)

令和元年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告について
<https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000681710.pdf>

2. インフルエンザワクチンの副反応疑い報告状況（令和元年シーズン）

（1）副反応疑い報告数・頻度

インフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告数及び同ワクチンの医療機関納入数量から算出した推定接種者数に基づく報告頻度は表1のとおりでした。

表1 副反応疑い報告数及び推定接種者数

推定接種者数 (回分)	製造販売業者からの報告数 (重篤報告)*		医療機関からの報告数**		
	重篤報告数(報告頻度)		報告数 (報告頻度)	うち重篤報告数(報告頻度)	
	うち死亡報告数			うち死亡報告数	
56,496,152 (R2.4.30現在)	55 (0.000097%)	1 (0.0000018%)	278 (0.00049%)	93 (0.00016%)	5 (0.0000089%)

約60倍の死亡者数

インフルエンザワクチン	死亡数	接種数	死亡数／接種数		
2017年(H29)シーズン（H29.10.1～H30.4.10）	9	49,176,766	0.00000018301		
2018年(H30)シーズン（H30.10.1～H31.4.10）	3	52,511,510	0.00000005713		
2019年(R1)シーズン（R1.10.1～R2.4.20）	6	56,496,152	0.00000010620		
		平均	0.00000011545		
					62.4 倍
	死亡数	接種数	死亡数／接種数		
新型コロナワクチン(2021年12月17日まで)	1431	198,497,730	0.00000720915		